

Etambutol (oral)

El ETAMBUTOL (e-THAM-byoo-tole, pronunciación en inglés) se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis (TB). Se lo utiliza junto con uno o más medicamentos para la TB. También puede utilizarse para otros problemas médicos. Informe a su médico, enfermera o farmacéutico si:

- sufre de alergias;
- está embarazada o planea quedar embarazada;
- está amamantando a un bebé;
- toma algún otro medicamento recetado, entre otros, píldoras anticonceptivas y diluyentes de la sangre;
- toma cualquier medicamento de venta libre, tales como medicamentos para el resfrío y calmantes (Tylenol[®], Advil[®], Motrin[®], aspirina);
- sufre algún otro problema médico, como enfermedades renales o neuritis óptica (daños al nervio ocular), gota, enfermedades hepáticas o consume alcohol.

Tome este medicamento:

- exactamente como se lo indicó su médico y NO deje de hacerlo hasta que se lo indiquen, aun cuando se sienta mejor;
- con alimentos si le produce malestar estomacal;

Advertencia:

- No se olvide de ninguna dosis. Si se olvida de una, tómela tan pronto como lo recuerde. Saltee la dosis olvidada si es casi el horario de la dosis siguiente programada. NO tome dos dosis al mismo tiempo.
- No comparta el medicamento con otros.
- Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.
- Visite a su médico periódicamente.
- Guarde el medicamento en un lugar seco y fresco, alejado del frío o calor extremo.
- Si cree haber ingerido una sobredosis de este medicamento, consulte a su médico.
- Restrinja el consumo de bebidas alcohólicas mientras esté tomando este medicamento para evitar posibles problemas hepáticos. Además, el alcohol puede disminuir la eficacia del medicamento.
- Si presenta visión borrosa, dolor en los ojos, daltonismo rojo-verde o pérdida de la visión, consulte inmediatamente a su médico.
- No conduzca ni realice trabajos peligrosos si este medicamento le causa mareos o visión borrosa, pérdida de la visión o daltonismo rojo-verde.

Los posibles efectos secundarios de este medicamento son, entre otros:

- náuseas, vómito o pérdida del apetito
- dolor estomacal
- dolor de cabeza
- mareos

Llame a su médico si presenta alguno de los siguientes efectos secundarios POCO COMUNES :

- fiebre o escalofrío;
- dolor o hinchazón en las articulaciones, especialmente del dedo gordo del pie, los tobillos o las rodillas
- calor intenso en la piel de la zona de la articulación afectada
- entumecimiento, debilidad, hormigueo o ardor en las manos o pies
- erupción cutánea, picazón fuerte o urticaria
- cualquier grado de pérdida de la visión, visión borrosa, dolor ocular, o daltonismo rojo-verde
- sibilancias o problemas para respirar

Reproducido, con autorización, de la United States Pharmacopeial Convention, Inc., 1989-2003. Impreso en marzo de 2003 por el Department of Nursing de la University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority, Madison, WI. Revisado por el Department of Pharmacy. UWH #4789.